

Propensione al Dissesto

Correlazioni indicative fra pericolosità e litologia, giacitura, acclività, uso del suolo

	Alternanza di litotipi o terreni granulari cementati, con bassa propensione al dissesto; lapideo o lapideo stratificato			
	$\leq 8^\circ$	$> 8^\circ \leq 15^\circ$	$> 15^\circ \leq 25^\circ$	$> 25^\circ \leq 35^\circ$
Seminativo, pascolo, praterie, spazi naturali, terrazzamenti abbandonati	G1	G2	G3	G3
Culture specializzate (frutteti, vigneti, oliveti, etc.)	G1	G2	G2	G2
Bosco e aree urbanizzate	G1	G1	G2	G2

Alternanza di litotipi o terreni, con media propensione al dissesto; lapideo stratificato a franapoggio meno inclinato	del pendio			
	$\leq 8^\circ$	$>8^\circ \leq 15^\circ$	$>15^\circ \leq 25^\circ$	
	G2	G2	G3	G3
	G1	G2	G3	G3
	G1	G2	G2	G2

Alternanza di litotipi o terreni, con elevata propensione al dissesto			
$\leq 8^\circ$	$> 8^\circ \leq 15^\circ$	$> 15^\circ \leq 25^\circ$	$> 25^\circ \leq 35^\circ$
G2	G3	G3	G3
G2	G2	G3	G3
G1	G2	G3	G3

Si consideri la presenza di orizzonti superficiali di minore qualità (alterati, fratturati, etc.) rispetto alle suddette categorie litologiche

Oltre 35° di acclività si consideri sempre G3